

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für Pferde



Tierärztliche Klinik für Pferde Bockhorn

Stand: November 2016

Empfehlung zur Wurmbekämpfung für Zuchtstuten

Behandlungszeitpunkt	Hauptindikation	Wirkstoff	Behandlung	Bemerkung
1 - 2 Tage nach Abfohlung	Verhinderung der Übertragung von <i>Strongyloides westeri</i>	ML	Jede Zuchtstute, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	
1 - 2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Strongyliden	ML	Jede Zuchtstute	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Juli/August	Strongyliden	Pyr/BZ (AR-Status im Bestand beachten)	Jede Zuchtstute, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
November/Dezember	Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer	ML + ggf. PZQ	Jede Zuchtstute, PZQ nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen	
Februar/März	Strongyliden	BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	Jede Zuchtstute, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für Fohlen

Behandlungszeitpunkt	Hauptindikation	Wirkstoff	Behandlung	Bemerkung
Alter 4 Wochen (ca. April/Mai)	Strongyloides westeri	BZ/IVM	alle Tiere d. Altersgruppe, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring durch Unters. v. Kotproben im Alter von 3 Wochen
Alter 2 Monate (ca. Mai/Juni)	P. equorum, Strongyliden	ML/BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere der Altersgruppe	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Alter 5 Monate (ca. August/September)	P. equorum, Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer	ML + ggf. PZQ	alle Tiere d. Altersgruppe, PZQ nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Alter 8 Monate (ca. November/Dezember)	P. equorum, Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer	ML + ggf. PZQ	alle Tiere d. Altersgruppe, PZQ nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Alter 11 – 12 Monate (ca. Februar/März)	P. equorum, kl. Strongyliden	ML/BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere d. Altersgruppe, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für Jährlinge und Jungpferde (bis einschl. 4 Jahre)

Behandlungszeitpunkt	Hauptindikation	Wirkstoff	Behandlung	Bemerkung
1 – 2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Strongyliden P. equorum	ML	alle Tiere der Altersgruppe	
4 – 5 Monate nach Weideaustrieb (August/September)	Strongyliden P. equorum	BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere der Altersgruppe	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
bei Aufstallung (November/Dezember)	P. equorum, Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer	ML + ggf. PZQ	alle Tiere d. Altersgruppe, PZQ nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Februar/März	Strongyliden P. equorum	BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere d. Altersgruppe, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für 5-jährige und ältere Pferde mit Weidegang

Behandlungszeitpunkt	Hauptindikation	Wirkstoff	Behandlung	Bemerkung
1 - 2 Monate nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Strongyliden	ML	alle Tiere der Altersgruppe	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
August/September	Strongyliden	BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere d. Altersgruppe, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
November/Dezember	P. equorum, Strongyliden, ggf. Gasterophilus-Larven, Bandwürmer	ML + ggf. PZQ	alle Tiere d. Altersgruppe, PZQ nur wenn Bandwurmbefall im Bestand nachgewiesen	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT
Februar/März	Strongyliden	BZ/PYR (AR-Status im Bestand beachten)	alle Tiere d. Altersgruppe, nur wenn Monitoring im Bestand positiv	Monitoring; falls positiv ggf. EZRT

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für Pferde

Samson-Himmelstjerna, G. v. und Mitarbeiter.:

Empfehlungen zur nachhaltigen Kontrolle von Magen-Darmwurminfektionen beim Pferd in Deutschland.

Pferdeheilkunde 27 (2011) 2 (März/April) 127 - 140.

Ertelt, A. und Mitarbeiter:

Aktueller Stand der Anthelmintika-Resistenzen bei Endoparasiten unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Deutschland.

Pferdeheilkunde 32 (2016) 6 (November/Dezember) 576 -586.

Empfehlungen zur Wurmbekämpfung für Pferde

Monitoring: Monitoring durch Untersuchung von Kotproben (ggf. bis zu 5 Tiere / Sammelkotprobe)

AR: Anthelmintika-Resistenz

BZ: Benzimidazole

IVM: Ivermectin

ML: Makrozyklische Laktone

PZQ: Praziquantel

PYR: Pyrantel

EZRT: Eizahlreduktionstest