

Impfungen beim Pferd

Erkrankung	Grundimmunisierung	Wiederholungs- impfung	Hinweis
Tetanus	<u>1. Impfung:</u> 6. Lebensmonat <u>2. Impfung:</u> 4-6 Wochen nach 1. Impfung <u>3. Impfung:</u> 1 Jahr nach der 2. Impfung	alle 2 (- 3 Jahre)	Impfschutz für jedes Pferd dringend erforderlich.
Influenza	<u>1. Impfung:</u> 8. Lebensmonat (Fohlen aus geimpften Stuten) bzw. 4. Lebensmonat (Fohlen aus ungeimpften Stuten) <u>2. Impfung:</u> 4-6 Wochen nach 1. Impfung	alle 6 Monate (12 Monate)	Empfehlung zur bestands- übergreifenden Impfung.
Herpes	<u>1. Impfung:</u> 8. Lebensmonat (Fohlen aus geimpften Stuten) bzw. 4. Lebensmonat (Fohlen aus ungeimpften Stuten) <u>2. Impfung:</u> 4-6 Wochen nach 1. Impfung	alle 6 Monate	Empfehlung zur bestands- übergreifenden Impfung. Besondere Bedeutung für Zuchtstuten.
Druse	ab dem 4. Lebensmonat 2 Impfungen im Abstand von 4 Wochen	alle 3 Monate	Nur Impfung von Pferden, für die das Risiko einer Infektion eindeutig besteht.
Hautpilz	ab dem 5. Lebensmonat 2 Impfungen im Abstand von 14 Tagen	alle 9 Monate 2 Impfungen im Abstand von 14 Tagen	Prophylaktische und therapeutische Einzeltierimpfung nach Bedarf.
Tollwut	1. Impfung im Alter von 6 Monaten	alle 2 Jahre	Impfempfehlung abhängig vom regionalem Vorkommen sowie Haltung der Pferde.
West Nile	1. Impfung ab 6. Lebensmonat; 2. Impfung 4.-6.Wo. nach der ersten Impfung;	alle 12 Monate	Zum Teil Impfpflicht im Ausland; Dann Einzeltierimpfung möglich;

Tierärztliche Klinik für Pferde
Dr. Jürgen Martens – Fachtierarzt für Pferde
Traugott Roewer

Bockhorner Landstrasse 64
23826 Bockhorn

TEL 04195-990040
FAX 04195-990050

info@pferdeklinik-bockhorn.de
www.pferdeklinik-bockhorn.de